

TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL (IFDE-5)

SILDENAFILO Viagra®, Vizarsin®, Revatio®	TADALAFILO Cialis®, Citax®, Adcirca®	VARDENAFILO Levitra®, Levatik®, Staxyn®	AVANAFILO Spedra®, Stendra®
--	--	---	---------------------------------------


Posología	25, 50, 100	2.5, 5 (diario), 10, 20	5, 10, 20	50, 100, 200
Inicio acción	30-60 min	20-30 min	30-40 min	15-20 min EL MÁS RAPIDO
Duración	4-5 horas Hasta 12 horas	24-36 horas EL MÁS DURADERO	5-6 horas	5-6 horas
Interacción con alimentos	SI COMIDA GRASA	NO	SI COMIDA GRASA	SI COMIDA GRASA
Efectos adversos	Dolor de cabeza Sofocos Alteraciones visuales	Dolor de cabeza Dispepsia Dolor de espalda/mialgias	Dolor de cabeza Sofocos Congestión nasal	Dolor de cabeza Sofocos EL QUE MENOS % RAM

SILDENAFILO SUSPENSIÓN ORAL (Bandol®, Revatio®):

Bandol® 12.5mg: 25-100mg (2-8 pulsaciones)

50 mg equivalen a 4 pulsaciones

A demanda aprox. 1 hora antes



Alprostadil:

-TÓPICO-INTRAURETRAL: MUSE®, VIRIREC®, VITAROS®

ACCIÓN 10 MIN, DURACIÓN 60-90 MIN

-INTRACAVERNOSO: CAVERJECT®, VIRIDAL®, EDEX®

ACCIÓN 10 MIN, DURACIÓN 40-60 MIN

++PROTOCOLO PROPUESTO CAVERJECT:

10---20---30---40---10+15PAPAVERINA---20+30PAPAVERINA

TRIMIX: ALPROSTADIL, PAPAVERINA, FENTOLAMINA